



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja 2010 – 2020

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020



VIII. Népegészségügyi Konferencia, Megnyitó 2017.

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON

HELYSZÍN
1000
2010-2015

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON

VIZSGÁLAT
5 MILLIÓ
2010-2016


Inkontinencia és vizeletürítési zavarok felmérése
Dr. Majoros Attila / Magyar Urológus Kontinencia Társaság

A vizeletinkontinencia meghatározása



**Akarattól függetlenül jelentkező bármely
húgycsövön keresztüli vizeletvesztés**


(International Continence Society, 2002)




A kérdés „népbetegség” mértékű



A „vizeletinkontinencia piramis”



A vizeletinkontinencia kivizsgálási algoritmus



ALAPELLÁTÁS
SZAKELLÁTÁS




Milyen gyakran vizek napközben? – NŐI BETEGEK ADATAI, n=19582




2014

■ 3-4-szer ■ 5-8-szor ■ gyakrabban




2015

■ 3-4-szer ■ 5-8-szor ■ gyakrabban




2016

■ 3-4-szer ■ 5-8-szor ■ gyakrabban



2014-2016 összesen


■ 3-4-szer ■ 5-8-szor ■ gyakrabban



Előfordul, hogy akaratomon kívül vizelést/vizeletszivárgást tapasztalok?




■ igen ■ nem




Milyen gyakran kell éjszaka vizelnie?



■ Rendszerint nem kell, néha, egyszer, ■ 2-4 szer ■ Többször, mint 4,




Fehérneműbe a vizelet elcseppentés, vagy elfolyás, elsősorban fizikai erőlködés: emelés, cipekedés



A vizelési inger jelentkezésekor azonnal el kell mennie WC-re, vagy tud vele várni?




■ Tud várni ■ 15-20 percet tud várni, de sietnie kell ■ Nem tud várni



A vizeletvesztés mellett kifejezetten vékony sugárban, esetleg, csak cseppekben, erősen préselve tud




■ nem ■ igen



Mennyire zavarja Önt a mindennapokban az akaratlan vizeelés (vizeletszivárgás, vagy elcsepegetés)?



2014-2016 összesen/ 15572 beteg válasza alapján




■ 0 ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10



Jelentkezett-e már ezzel a problémával orvosánál?




■ nem ■ igen





2014-2016 összes beteg




■ Háziorvos ■ Nőgyógyász ■ Urológus ■ Egyéb



Talált-e valamilyen megoldást problémájára?




■ nem ■ igen





2014-2016 összes adat alapján




- Gyógyszer
- Inkontinencia betét
- Női higiéniai betét
- Torna
- Műtét
- Egyéb



2014-2016 összes adat alapján


- Nincs inkontinenciára utaló tünet
- Forduljon házi orvosához inkontinencia kivizsgálás céljából




Életkor besorolások 10 éves bontásokban (-18-25-35-45-55-65-75-)



2014-2016 összes adat alapján



Előfordul, hogy akaratomon kívül vizelést/vizeletszivárgást tapasztalok? Korcsoport szerinti megoszlás




Milyen gyakran vizek napközben? – FÉRFI BETEGEK ADATAI




2014

■ 3-4-szer ■ 5-8-szor ■ gyakrabban




2015

■ 3-4-szer ■ 5-8-szor ■ gyakrabban




2016

■ 3-4-szer ■ 5-8-szor ■ gyakrabban




2014-2016 összes beteg

■ 3-4-szer ■ 5-8-szor ■ gyakrabban




Előfordul, hogy akaratomon kívül vizelet/vizeletszivárgást tapasztalok?




Milyen gyakran kell éjszaka vizelnie?



■ Rendszerint nem kell, néha, egyszer, ■ 2-4 szer ■ Többször, mint 4




Fehérneműbe a vizelet elcseppentés, vagy elfolyás, elsősorban fizikai erőlködés: emelés, cipekedés




A vizelési inger jelentkezésekor azonnal el kell mennie WC-re, vagy tud vele várni?



■ Tud várni ■ 15-20 percet tud várni, de sietnie kell, ■ Nem tud várni




A vizeletvesztés mellett kifejezetten vékony sugárban, esetleg, csak cseppekben, erősen préselve tud




Mennyire zavarja Önt a mindennapokban az akaratlan vizelés (vizeletszivárgás, vagy elcsepegés)?



■ 0 ■ 1 ■ 2 ■ 3 ■ 4 ■ 5 ■ 6 ■ 7 ■ 8 ■ 9 ■ 10




Jelentkezett-e már ezzel a problémával orvosánál?






2014-2016 összesen



Talált-e valamilyen megoldást problémájára?




■ nem ■ igen






2014-2016 összes beteg



■ Gyógyszer ■ Inkontinencia betét ■ Női higiéniai betét ■ Torna ■ Műtét ■ Egyéb



2014-2016 összes beteg




- nincs inkontinenciára utaló tünet
- forduljon házi orvosához inkontinencia kivizsgálás céljából


Életkor besorolások 10 éves bontásokban (-18-25-35-45-55-65-75-)



2014-2016 összes adat alapján



Előfordul, hogy akaratomon kívül vizelést/vizeletszivárgást tapasztalok? Korcsoport szerinti megoszlás





- A vizeletinkontinencia továbbra is „tabu téma”
- Népbetegség mértékű probléma
- Az érintettek jelentős hányada nem fordul orvoshoz
- Nagy az „öngyógyítás” aránya
- Fő feladat a „rejtőzködő betegek” felkutatása
- Betegutak kialakítása




Köszönöm megtisztelő figyelmüket

Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON

HELYSZÍN
1000
2010-2015



Magyarország átfogó egészségvédelmi szűrőprogramja
2010 – 2020

NÉPEGÉSZSÉGÜGYI PREVENCIÓ MAGYARORSZÁGON

VIZSGÁLAT
5 MILLIÓ
2010-2016